

Het eten van ontlasting (Coprophagia) bij honden

Geschreven door Diernet Team

vrijdag, 01 april 2011 15:06 - Laatst aangepast donderdag, 25 augustus 2011 14:54

[Omschrijving](#)

[Oorzaken](#)

[Verschijnselen](#)

[Diagnose](#)

[Therapie](#)

[Prognose](#)

Omschrijving

Coprophagia wordt gedefinieerd als het eten van elk type ontlasting. Coprophagia wordt beschouwd als een natuurlijk gedrag dat tijdens de evolutie is ontstaan bij wilde honden, om te kunnen overleven in tijden van voedselschaarste.

Moeder honden (fokteven) eten vaak de uitwerpselen van hun pups om hun nest schoon te houden. Dit gebeurt meestal totdat de pups een leeftijd van 3 weken hebben bereikt en fysiek in staat zijn om hun ontlasting buiten het nest te doen. Honden eten ook vaak de ontlasting van katten en landbouwhuisdieren uit hun directe leefomgeving.



Oorzaken

Coprophagia kan een gedragsprobleem zijn of kan ontstaan door een ander medisch probleem.

Het eten van ontlasting (Coprophagia) bij honden

Geschreven door Diernet Team

vrijdag, 01 april 2011 15:06 - Laatst aangepast donderdag, 25 augustus 2011 14:54

Coprophagia kan gezien worden als een soort alternatief gedrag bij een dier dat zich in een stressvolle situatie bevindt, zoals plotselinge veranderingen in de omgeving.

Het kan ook een tactiek zijn om straf te ontlopen voor het feit dat de ontlasting op een niet toegestane plaats is gedaan.

Coprophagia kan bij een pup per vergissing worden aangeleerd tijdens het zindelijk maken doordat de pup op zijn donder krijgt na het poepen in huis of wanneer hij ziet dat zijn baas de ontlasting "opruimt". De pup leert op deze manier de ontlasting te "verbergen" door het meteen op te eten.

Inwendige parasieten of ziekten die belangrijke orgaan systemen ontregelen (zoals van de alveesklier of de schildklier) kunnen het eten van ontlasting in de hand werken. Inwendige parasieten en bepaalde ziekten kunnen de opname van voedingsstoffen uit de voeding voorkomen, waardoor het dier, zelfs na het nuttigen van een maaltijd, honger blijft houden en over gaat tot het eten van ontlasting. Coprophagia kan dus een teken zijn van een onderliggend medisch probleem.

{youtube}Wmlv121iZkY{/youtube}

Verschijnselen

Klinische symptomen die zich meestal voordoen bij deze aandoening:

- Diarree
- Braken
- Overmatige dorst, veel drinken
- Abnormaal gedrag, agressie, veranderende gewoonten
- Slechte adem, vieze geur uit de bek
- Verhoogde urineproductie

Het eten van ontlasting (Coprophagia) bij honden

Geschreven door Diernet Team

vrijdag, 01 april 2011 15:06 - Laatst aangepast donderdag, 25 augustus 2011 14:54

Diagnose

Terwijl coprophagia vaak wordt gediagnosticeerd op basis van een klacht van de eigenaar, zal een dierenarts bij navraag meer willen weten over de leefomgeving van de hond, welk voer het huisdier krijgt voorgeschoteld en zich op de hoogte willen stellen op welke manier de eigenaar met het dier omgaat. Het is belangrijk om te bepalen of de coprophagia een gedragsprobleem is of dat het een gevolg is van een medisch probleem. Daarom kan het nodig zijn om een evaluatie van de voeding, een lichamelijk onderzoek, bloed-en urineonderzoek, en een analyse van specifieke orgaanfuncties uit te voeren teneinde de oorzaak van deze afwijking te kunnen diagnosticeren.

Therapie

De behandeling van coprophagia hangt ervan af of het een zuiver gedragsprobleem is of dat het een aanwijzing is van een onderliggende medische aandoening.

Het gedragsprobleem "Ontlasting eten" kan worden voorkomen door het wegnemen van de toegang tot ontlasting, het dier afleiden met voedsel als beloning, en/of het gebruik van gedragstherapeutische technieken.

In sommige gevallen kan deze afwijking behandeld worden door de toepassing van specifieke producten die door uw dierenarts worden aanbevolen. Deze producten zorgen ervoor dat de eigen ontlasting slecht smaakt waardoor coprophagia wordt ontmoedigd.

Coprophagia dat veroorzaakt wordt door een onderliggende medische aandoening zal doorgaans vanzelf verdwijnen wanneer de ziekte met succes kan worden behandeld.

Het eten van ontlasting (Coprophagia) bij honden

Geschreven door Diernet Team

vrijdag, 01 april 2011 15:06 - Laatst aangepast donderdag, 25 augustus 2011 14:54

Prognose

De prognose voor een dier dat coprophagia vertoont als gedragsprobleem is uitstekend, indien de eigenaar van het dier in staat is om de aanbevelingen van de dierenarts consequent te volgen. De prognose van coprophagia dat veroorzaakt wordt door een medisch probleem zal sterk variëren en zal afhankelijk zijn van de ernst van de onderliggende ziekte en de respons op de behandeling.